

FNPPSF

Pour une augmentation de la taille des captures



Suite à de nombreuses demandes, je vous joins le tableau récapitulatif des évolutions des tailles minimales de capture proposées par les cinq fédérations signataires de la charte. Ces évolutions constituent, à elles seules, une vraie limitation bien plus pertinente que toute autre forme de quota journalier totalement inadapté à la pêche de loisir.

Elles doivent être considérées comme une étape et non comme une fin en soi. D'autres évolutions sont envisageables à moyen terme si les stocks évoluent favorablement, comme nous sommes en droit de le penser...

Si ces mesures ne sont pas appliquées aussi à l'ensemble des pêcheries professionnelles, il est évident qu'elles n'auront qu'un impact très limité sur la ressource.

| PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES TAILLES LÉGALES DE PRISES DE POISSONS, DE COQUILLAGES ET DE CRUSTACÉS | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|
| Désignation | Nom scientifique | Taille globale | Taille actuelle |
| POISSONS AYANT DÉJÀ UNE TAILLE LÉGALE MINIMALE | | | |
| Bar commun (Atlantique) | <i>Dicentrarchus labrax</i> | 42 cm | 36 cm |
| Barloup commun Méditerranée | <i>Dicentrarchus labrax</i> | 30 cm | 25 cm |
| Cabillaud | <i>Gadus morhua</i> | 42 cm | 36 cm |
| Espadon | <i>Xiphias gladius</i> | 170 cm | 25 kg ou 125 cm |
| Rouget-barbet ou de Roche (Méd. et Atl.) | <i>Mullus spp</i> | 15 cm | 11 cm |
| Sar commun (Atlantique) | <i>Diplodus sargus</i> | 25 cm | 25 cm |
| Sar commun (Méditerranée) | <i>Diplodus sargus</i> | 23 cm | 23 cm |
| Sole (Atlantique) | <i>Solea vulgaris</i> | 25 cm | 24 cm |
| Sole (Méditerranée) | <i>Solea vulgaris</i> | 25 cm | 23 cm |
| POISSONS N'AYANT PAS DE TAILLE LÉGALE MINIMALE | | | |
| Bar moucheté | <i>Dicentrarchus punctatus</i> | 30 cm | |
| Chapon | <i>Scorpaena scrofa</i> | 30 cm | |
| Congre | <i>Conger conger</i> | 60 cm | |
| Corb | <i>Sciaenops ocellatus</i> | 35 cm | |
| Dorade grise et rose | <i>Spondyliosoma cantharus</i> et <i>Pagellus bogaraveo</i> | 23 cm | |
| Dorade royale (Atl. et Méd.) | <i>Sparus aurata</i> | 25 cm | |
| Limande | <i>Limanda limanda</i> | 20 cm | |
| Limande sole | <i>Microstomus kitt</i> | 25 cm | |
| Lotte | <i>Lophius piscatorius</i> | 50 cm | |
| Maigre | <i>Argyrosomus regius</i> | 45 cm | |
| Mostelle | <i>Phycis blennoids</i> | 30 cm | |
| COQUILLAGES ET CRUSTACÉS | | | |
| Coquille Saint-Jacques | <i>Pecten maximus</i> | 11 cm | 10,2 à 11 cm |
| Étrille | <i>Necora puber</i> | 6,5 cm ⁽¹⁾ | largeur ou longueur |
| Bouquet | <i>Leander serratus</i> ou <i>Palaemon serratus</i> | 5 cm | 3 ou 5 cm |
| Autres crevettes | | 3 cm | |
| Coque | <i>Carastoderma edule</i> | 3 cm | 2,7 ou 3 cm |
| Palourde | <i>Tapes decussatus</i> et <i>Tapes philippinarum</i> | 4 cm | 3,5 ou 3,8 ou 4 cm |

(1) Dimensions prises dans la largeur.

En rouge, les propositions de changement.