

# LA BONITE À DOS RAYÉ

Son nom commun est bonite à dos rayé, son nom scientifique est *Sarda sarda*, de la famille des scombridés, ordre des perciformes, classe des ostéichthyens.

La bonite à dos rayé présente les **caractéristiques morphologiques typiques des grands poissons migrateurs** marins telles que : un corps fusiforme légèrement comprimé latéralement, un pédoncule caudal très fin, l'ensemble donnant au poisson une forme parfaitement hydrodynamique. Ses flancs et son ventre sont argentés. La bonite à dos rayé est un **poisson grégaire**. Elle **se déplace en bancs**. De nombreux individus effectuent des migrations sur des grandes distances en suivant les bancs de petits poissons. Elle fréquente les mers tempérées et est présente en mer Noire, mer Méditerranée, Atlantique et le long des côtes africaines. L'été, elle remonte le long des côtes européennes, parfois jusqu'en Norvège.

En mer Noire, la bonite à dos rayé acquiert sa maturité sexuelle à deux ans mais sur les côtes du Sénégal à un an. En mer Méditerranée, la ponte se déroule entre mai et juillet, en Atlantique, principalement le long des côtes marocaines, en juillet. La reproduction s'effectue de la même façon que pour les autres poissons migrateurs pélagiques. Chaque femelle libère de 400.000 à 3 millions d'œufs, selon sa taille. Dans un premier temps, les alevins d'environ 20 mm, se nourrissent de zooplancton et de larves. Ensuite, ils se nourriront de petits poissons qu'ils chassent en bancs. Leur croissance est très rapide et les individus peuvent atteindre 40 cm au bout d'une année dans les eaux tempérées. Ils se nourrissent alors de poissons tels que sardines, anchois, lisettes, chinchards, etc. qu'ils chassent en bancs, visibles à la surface par une activité importante des oiseaux et une eau « bouillonnante » avec leurs dorsales dépassant de l'eau. Les adultes peuvent atteindre la taille de 90 cm pour environ 10 kg. En pêche de loisir de la bonite à dos rayé, il faut plutôt opter pour la **pêche aux leurres ou la pêche aux appâts naturels** (sardines, anchois, etc.), au lancer léger à moyen, afin de privilégier le plaisir.

**Aux leurres**, cherchez les chasses et effectuez une approche discrète, lancez au-delà de la chasse afin de ramener le leurre dans celle-ci ; méthode infallible, à tous les coups on fait mouche ! Mais si l'approche n'a pas été suffisamment discrète, la bonite sonde et vous pourrez attendre longtemps avant la prochaine chasse...

**Aux appâts naturels**, dans la zone fréquentée par les bonites, mettez en place un broumé, eschez une petite sardine, un anchois ou un morceau, si les appâts sont trop gros, et laissez partir la ligne sans la lester, si le courant n'est pas trop fort, assez loin du bateau car la bonite est un poisson méfiant. La récompense sera une touche violente avec un combat de toute beauté.

**L'été et l'automne, on pourra aussi la pêcher à la traîne légère**, avec une vitesse de traîne de 5 nœuds, plus lentement, ce seront les maquereaux qui attaqueront les leurres. Les lignes seront armées de poissons vivants ou morts, lestées ou pas, de leurres flottants ou plongeants, selon la profondeur à laquelle vous souhaitez pêcher.

Il est possible de faire précéder les leurres ou appâts d'une mitraille « spéciale bonite », l'idéal étant de panacher les différents appâts. La pêche à la bonite peut être très prolifique.

**N'oubliez pas d'appliquer les règles de bonnes pratiques de la pêche de loisir, le strict minimum pour un repas en famille ou entre amis afin de pouvoir encore longtemps profiter de la pêche de ce magnifique poisson.**



## AUTRES BONITES... ses cousines

La **bonite blanche** ou palomète blanche, *Orcynopsis unicolor*, est présente en Mer Méditerranée et Atlantique tropical. Plus rare que la bonite à dos rayé, son corps est dépourvu d'écaillles sauf au niveau de la caudale, son dos est de couleur bleu métallique, ses flancs et son ventre sont argentés. La palomète blanche peut atteindre 1.30 m pour un poids de 13 kg.

La **bonite à ventre rayé**, *Euthynnus pelamis* ou *Katsuwonus pelamis*, aussi appelée thon listao ou thon rose, est présente en mer Méditerranée, dans le golfe de Gascogne, et dans tous les océans tropicaux. Ce poisson subit une pression de pêche professionnelle très importante à travers le monde entier. Son corps est dépourvu d'écaillles sur sa presque totalité. Son dos est de couleur bleu métallique, avec parfois des nuances vertes. Ses flancs sont argentés et son ventre également avec quatre ou cinq raies longitudinales noires. Il peut atteindre 1.10 m pour 20 kg.

La **thonine**, *Euthynnus alletteratus*, possède la même répartition géographique que la bonite à ventre rayé, avec laquelle elle est souvent confondue. Son corps est plus élancé, son dos est gris sombre, marqué par des marbrures jaunâtres, des raies onduleuses sous la ligne latérale avec des taches sombres sous les pectorales. Elle peut atteindre 1.30 m pour 17 kg.

Le **bonitou**, *Auxis rochei rochei*, se trouve en mer Méditerranée et dans tous les océans tropicaux. Le bonitou possède des nageoires dorsales éloignées. Son dos est bleu sombre avec des marbrures noirâtres. Son ventre et ses flancs sont blanc nacré. Il peut atteindre 50 centimètres pour un poids de 6 kg.