

NDLR : nous contestons cette situation injuste et discriminatoire.


Nos nombreuses demandes adressées à la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) sont restées vaines. Nous envisageons une action en justice devant les instances nationales et européennes pour discrimination et non-respect des directives européennes et de la Politique commune des pêches (PCP).

RAIE BRUNETTE

Raja undulata
Undulate ray



Raie benthique



Longueur max = 120 cm (souvent entre 80 et 100 cm)^{2,3}

Habitat

Espèce benthique, principalement sur fonds meubles (sable, vase ou graviers) mais aussi herbiers.⁸


Zone côtière du plateau continental. Souvent dans les 50 premiers mètres de profondeur (jusqu'à 200m, voire 300m en Méditerranée).^{2,4}

Régime alimentaire

Différences observées selon les saisons et la taille des individus.

Alimentation diversifiée chez les juvéniles, plus spécialisée chez les adultes.⁹

Juveniles → Adultes



Statut de conservation IUCN

(liste rouge Internationale pour la Conservation de la Nature)

NE DD LC NT VU EN CR EW EX

— France (2013)¹² — Europe (2015)¹³

Tendance de la population ? ?

Critères de vulnérabilité : distribution morcelée, taille à maturité sexuelle élevée, manque de connaissances.

Références :

1 - APECS Guide identification capsules (2012), 2 - Serena et al. (2010), 3 - Louisy (2002), 4 - Stephan et al. (2015), 5 - Coelho & Erzini (2006), 6 - Serra-Pereira et al. (2015), 7 - McCully et al. (2012), 8 - Du Buit (1968), 9 - Moura et al. (2008), 10 - Arrêté du 29/04/15 réglementant la pêche de loisir de la raie brunette [...], 11 - Règlement (UE) 2020/123 du conseil du 27/01/20 établissant pour 2020 les possibilités de pêche [...], 12 - IUCN France & MNHN (2013), 13 - Ellis et al. (2015)

Taille à maturité sexuelle (L50)

Variations entre les mâles et les femelles et en fonction des secteurs géographiques.⁴

	♀ (cm)	♂ (cm)
Répartition globale ^{5,6,7}	76 - 87	73 - 83
Manche ⁴	83,1	78,4
Golfe de Gascogne ⁴	83,8	81,2

Reproduction

Mode: oviparité

Ponte : de mars à septembre, pic au printemps. Autour d'une 100^{ème} d'oeufs/femelle/an²

Développement de l'embryon dans la capsule : 5 à 7 mois⁶

Taille à l'éclosion : 13 à 14 cm⁶

Source : apecs.fr